Corticothérapie anténatale

(Fédération de Périnatalité, 22 novembre 2002)

En première intention

CELESTENE Chronodose 2 ampoules à 6 mg en IM (12 mg) à renouveler 24 heures plus tard

DEBUT / FIN : 26 à 35⁺⁶ SA, mais

- à partir de 23 SA si grave menace d'accouchement prématuré
- pas après 33⁺⁶ SA si déjà une cure antérieure

NOMBRE DE CURES

- **2 cures au maximum**, espacées de 10 à 30 jours
- certains cas exceptionnels peuvent justifier une troisième cure.

SITUATIONS PARTICULIERES :

Accouchement imminent, préférer :

CELESTENE « simple » 3 ampoules à 4 mg en IVDL (12 mg) à renouvel. 24 h + tard

Voie intra-musculaire déconseillée (HBPM...), préférer :

CELESTENE « simple » 3 amp à 4 mg en IVDL (12 mg) à renouvel. 24 h + tard

Allergie ou intolérance avérée au CELESTENE, opter pour :

- SOLUDECADRON 3 amp. à 4 mg en IVDL ou IM (12 mg) à renouvel. 24 h + tard
- ou bien même : HYDROCORTISONE : 2 amp 500 mg à renouvel. 24 h + tard.