

Tests de Kleihauer sanguins en période anténatale

<p style="text-align: center;">A. Kleihauer sanguin urgent à adresser à l'EFS, ou bien en dehors des heures ouvrables* au laboratoire d'urgences de l'H. Roger Salengro **</p>	<p style="text-align: center;">B. Kleihauer sanguin <u>non urgent</u> à adresser à l'EFS</p>	<p style="text-align: center;">C. Pas de Kleihauer</p>
<p style="text-align: center;">① + ② + ③ nécessaires</p> <p>① Traumatisme abdominal ou ponction anténatale récents (< 24 h)</p> <p>et</p> <p>② ↓ Mouvts actifs ou Anomalies RCF <u>ne justifiant pas d'une extraction immédiate</u></p> <p>et</p> <p>③ Age gestationnel ≥ 26 SA (viabilité)</p>	<p>Traumatisme abdominal ≥ 12 SA et n'entrant pas dans le cadre de A</p> <p>Avant injection d' anti D pour Rhésus négatif dans les situations suivantes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Métrorragies du 2^e et 3^e trimestre - Hématome - Gestes transplacentaires... 	<p>Métrorragies isolées du 2^e et 3^e trimestre, si Rh positif</p> <p>Injection anti D pour Rhésus négatif et terme < 12 SA</p> <p>Sang vaginal (plus aucune indication)</p>

* Heures ouvrables : du lundi au vendredi dernière navette pour l'EFS à 16h15, le samedi dernière navette à 10h40, pas le dimanche

* En dehors des heures ouvrables : Laboratoire de biologie d'urgence (36 407) : **bon** rempli par le médecin prescripteur (en quoi la réalisation du test en urgence peut-elle modifier immédiatement la décision obstétricale ?)

Note :

1. Il n'y a **plus aucune indication** à réaliser **un test de Kleihauer sur sang vaginal**
2. Les **métrorragies** du 2^e et 3^e trimestre ne justifient **pas de Kleihauer sanguin anténatal**, sauf chez les femmes Rhésus négatif (non urgent : colonne B, adaptation éventuelle de la dose d'anti D injectée)